AVERTISSEMENTS AGRICOLES

R

□ STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES D

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE

ET DE LA FORÊT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Ancienne Conserverie de CASAMOZZA

LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 192 du 20 Mars 1991

Н

AGRUMES

Aprés la taille

ARBRES A NOYAUX

: Thrips

VIGNE

: Deufs de cicadelle


CULTURES MARAICHERES

: La mouche blanche

AGRUMES

La taille n'est pas terminée, pour certains profiter si ce n'est dèjà fait, d'effectuer les traitements à grand volume et à la lance si possible avec une huile blanche plus un insecticide.

ARBRES A NOYAUX



** Nectariniers

Les variètés parvenues au stage G.H. dès la nouaison sont susceptibles d'être attaquées par les larves d'un minuscule insecte " le Thrips". Le jeune fruit dont les tissus sont fragiles sont donc piqués à ce stade. Ils présenteront en cours de grossissement des marques et rugosités de la peau, dépréciant l'aspect commercial du fruit.

Thrips adulte

Intervenir dans les vergers ayant été inquiètés par ce parasite l'an passé, ou observer la présence à la loupe avant de traiter avec les produits suivants :

- AZOFENE ZOLONE
- TAMARON ORTHOTOX
- KLARTAN -
- ORTHENE

I S S N C7 39 - 9633

Publication Périodique CPPAP Nº 1769 - AD

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA Directeur - Gérant : J.C. COQUET

Abonnement Annuel : Régisseur de Recettes

79

** Amandiers

Renouveler sans tarder le traitement Botrytis, monilia.

** Pruniers

Les variètés **Primacote** et **Tardicote** sont en pleine floraison, intervenir contre le **monilia**.

VIGNE



** Flavescence dorée

Les neufs de cicadelle vectrice de cette maladie sont sensibles aux traitements à base d'oléoparathion (45 gr hl) effectués au moins deux à trois semaines avant le débourrement.

B

Bourgeon dans le coton

CULTURES MARAICHERES

** Lutte contre la mouche blanche

Dans les tunnels de " **Tomates** ", les panneaux jaunes englués ont dû être installés ... A proximité des ouvertures à hauteur des plants. Observer les premières captures de mouches blanches.

Dans le cas de lutte biologique avec l'aide de prédateurs tels que : Encarsia Formosa (petite guêpe qui pond dans les larves de la mouche) que l'on aura en soin de commander en temps utile aux fournisseurs (contrats). Disposer les petites plaquettes d'oeufs que l'on aura reçu en chronopost, sur les plants les plus beaux au niveau du bouquet.

Contacter le S.R.P.V. pour plus de précisions.

(C) SERVICE.DE LA PROTECTION DES VEGETAUX - 1991 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.